

# Diferenciální diagnostika bolesti v mesogastriu/PGS (VPL)



## Tento článek je určen pro postgraduální studium Všeobecného praktického lékařství

Článek je součástí vypracovávaných atestačních otázek, jejichž seznam můžete najít na portálu Všeobecného praktického lékařství.

## Bolesti v mezogastriu

Bolesti v okolí pupku nejčastěji způsobuje onem. tenkého střeva, apendicitida, onem. velkých cév (aorty / DDŽ).

### Intraabdominální příčiny

#### Gastritida:

- příznaky - dyspepsie, pocit plnosti, nechut k jídlu, zvracení;
- akutní gastritida (symptomy a anamnézy), chronická gastritis, gastroskopie s provedením biopsie.

#### Ulcus ventriculi:

- hematemeze,
- gastroskopie, RTG.

#### Chronická pankreatitida:

- anamnéza: abúzus alkoholu, bolestivé ataky lokalizované v pásu nadbřišku, vystřelující do zad,
- průkaz exo- a endokrinní insuficience pankreatu (chymotrypsin ve stolici), USG, scintigrafie, ERCP, CT, angiografie.

#### Morbus Crohn:

- bolesti břicha, chronický průjem, ztráta hmotnosti, horečka, zánětlivé parametry zvýšeny,
- RTG změny (relief dlažebních kostek, píštěle, stenózy), ileo-koloskopie.

#### Enteritida:

- difúzní křečovitě bolesti břicha, zvracení a průjem,
- kultivace stolice.

#### Chronická apendicitida:

- bez obranného napětí břišní stěny, bolestivost teprve při hluboké palpacii,
- histologicky - klinicky je dg. obtížná.

#### Dráždivý tračník:

- obstipace...
- obstipace... str.250

#### Chronické poruchy prokrvení

- přítomny symptomy: hypertenze, DM, porucha metabolismu lipidů, kouření,
- typická TRIAS: postprandiální bolesti + malabsorpce + intraabdominální šelest,
- vyšetření - cévní doplerovská duplexní USG (DUS), arteriografie.

#### Porfyrie:

- difúzní bolest (kolikovitěho charakteru), motorická obrna, cerebrální symptomy, tachykardie a hypertenze, horečka, moč načervenalého zbarvení,
- laboratorně - porfobilinogen v moči.

#### Hemochromatoza:

- v 30-40 % abdominální bolesti nejasné etiologie,
- Fe (železo) v séru, biopsie jater.

#### Intoxikace olovem:

- - periodické střevní koliky se zácpou, olověný lem na dásních, anémie,
  - Pb (olovo) v krvi a moč, krevní obraz (přítomny tečkovné bb.), kyselina delta-aminolevulová a koproporfyryl III v krvi.

## Extraabdominální příčiny

### Bolesti původem od páteře:

- trauma,
- TBC,
- tumor,
- artritida.

## Odkazy

### Související články

- Diferenciální diagnostika bolesti v epigastriu/PGS (VPL)
- Diferenciální diagnostika bolesti v hypogastriu/PGS (VPL)

### Použitá literatura

- HEHLMANN, Annemarie a Jana BERNARDOVÁ. *Hlavní symptomy v medicíně : praktická příručka pro lékaře a studenty*. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. ISBN 9788024726120.