

# Diskuse:Enterobióza/Archiv

## diagnostika

Perianální otisk na lepicí pásku – k průkazu vajíček (na noc se lepicí páska přilepí k okolí anu, roury pak v noci vylézají ven a kladou vajíčka, která se přichytí k lepicí pásce, která se poté prohlídne v mikroskopu). -to je nejaka novinka, alebo je to blbost?  
91.217.96.154 11.5.2017, 18:22

Vážený uživateli,

nejedná se o žádnou dezinformaci, nýbrž o perianální otisk podle Grahama (dostupné například v učebnici Infekčního lékařství, Beneš, Galén, první vydání, 2009, strana 349). Takto lze prokázat infekci těmito helminty.

S pozdravem,



MUDr. Václav Rejlek -- redakce WikiSkript 12.5.2017, 07:31

ano jasne, len ten postup je zvlastny:

- na noc se lepicí páska přilepí k okolí anu, roury pak v noci vylézají ven a kladou vajíčka, která se přichytí k lepicí pásce, která se poté prohlídne v mikroskopu páska na celu noc? pokiaľ viem tak sa iba zobere paskou otisk rano po zobudení. možno sa mylím, ale pride mi to cudne..kam sa tie vajicka zachytia? na hladku stranu pasky?

dakujem za odpoveď

91.217.96.154 14.5.2017, 08:31

V praxi jsem tento postup nikdy neviděl, takže Vám to nemohu do detailů popsat. Nicméně na internetu se jistě dozvíte informací více. Předpokládám, že páska je oboustranně lepicí. Je to metoda osvědčená, běžně užívaná, samozřejmě někomu se může zdát podivná. Ale v medicíně je mnoho podivných věcí.



MUDr. Václav Rejlek -- redakce WikiSkript 14.5.2017, 16:06

<http://www.hpl.sk/odborna-zona/vysetrenia/parazitologia/vermicularis> (<http://www.hpl.sk/odborna-zona/vysetrenia/parazitologia/vermicularis>) :

Odber sa vykonáva ráno hneď po zobudení, pričom perianálna oblasť nesmie byť umytá ani predchádzajúci večer, ani pred odberom. Páska sa lepiacou stranou pritlačí na perianálnu oblasť a nalepí na podložné sklíčko. Vzhľadom k nepravidelnému vylučovaniu vajíčok samičkami, je na vyšetrenie potrebné odobrať minimálne 3 vzorky s odstupom aspoň jedného dňa. Lepiaca páska prilepená na podložnom skle a riadne označená sa odošle do laboratória. Biely štítok s menom pacienta sa nalepí na okraj podložného sklíčka, neprelepjuje sa štítkom celé podložné sklo, komplikuje to hodnotenie nálezu. [https://en.wikipedia.org/wiki/Pinworm\\_infection#Diagnosis](https://en.wikipedia.org/wiki/Pinworm_infection#Diagnosis) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Pinworm\\_infection#Diagnosis](https://en.wikipedia.org/wiki/Pinworm_infection#Diagnosis)) : Transparent adhesive tape (e.g. Scotch Tape) applied on the anal area will pick up deposited eggs, and diagnosis can be made by examining the tape with a microscope.[15][20] This test is most successful if done every morning for several days, because the females do not lay eggs every day, and the number of eggs vary. [20]

vy pisete : na noc se lepicí páska přilepí k okolí anu... viem ze ide o detail, ale je to matuce  
91.217.96.154 16.5.2017, 12:32

Vážený uživateli,

děkuji Vám za váš zájem a řešerši dotyčného problému. Jak píšete, jedná se o detail, který je sice medicínsky nepřiliš závažný, nicméně v praxi důležitý. Děkuji Vám za dohledání správného postupu perianálního stěru! Rádi bychom Vás povzbudili, abyste článek v tomto smyslu upravitel a doplnil příslušné citace.

S pozdravem,



MUDr. Václav Rejlek -- redakce WikiSkript 9.7.2017, 09:47

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send

Cancel