

Diskuse:Prekoncepční prevence dědičných chorob a vad

Postup redakčního zpracování

K redakční kontrole ještě zbývá • synonyma a název • obrázky a licence

V článku bylo zkontrolováno • zdroje • citace • kategorie a portály • členění a nadpisy • prolinkování • pravopis • typografie

Dokážete-li některé z doporučených úprav provést, směle se do nich pusťte! V případě jakýchkoli nejasností se můžete podívat do nápovědy nebo se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send

Cancel

Připomínky k článku

Prosím o upřesnění zdroje ohledně uváděné preventivně užívané dávky acidum follicum. Obecně je doporučována dávka okolo 0,4mg - viz například CDC (<http://www.cdc.gov/ncbddd/folicacid/recommendations.html>), EUROCAT (<http://www.eurocat-network.eu/pagecontent.aspx?pageid=114>). Takto vysoké dávky (obecně v rozsahu několika miligramů) jsou doporučovány až v případě výskytu rozštěpových vad neurální trubice v rodinné anamnéze a obecně je doporučuje lékař a to individuálně. V České republice podobné doporučení ohledně doporučovaných dávek kyseliny listové v perikoncepčním období (prozatím) chybí. Je možné, prosím, dohledat zdroj zde uvedeného dávkování? --Azrael (Antonín Šípek) 11. 2. 2010, 23:12 (UTC)