

Diskuse:Schistosomóza/Archiv

plicni hypertenze

Na toto onemocnění každý rok zemře více než 200 tisíc lidí a celosvětově je nejčastější příčinou rozvoje plicní hypertenze. [1] ???????????? nejcastejsi pricinou plicni hypertenze? niekto to prosim opravte...tu je clanok z ktoreho ste cerpali : <https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2004/05/02.pdf> (<https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2004/05/02.pdf>)

91.217.96.154 14.5.2017, 09:27

Vážený uživateli,

děkuji za podnětný dotaz. Schistosomóza je skutečně nejčastější příčinou rozvoje plicní arteriální hypertenze – "PAH u schistosomiázy byla zařazena do první skupiny v roce 2008, schistosomiáza dnes představuje nerozšířenější příčinu vzniku PAH. Celosvětově je postiženo více než 200 miliónů nemocných, 10 % z nich trpí hepatosplenickou formou (20 miliónů nemocných) a z nich pak rozvine PAH 5 %, což je přibližně 1 milión nemocných. Mortalita dosahuje až 15 % do 3 roků od diagnózy onemocnění [18]." (viz. <http://wp.interna-cz.eu/nova-verze-klasifikace-plicni-hypertenze/>)). Avšak chápu, že původní reference neodpovídaly a bylo to matoucí. Proto jsem reference upravila a doplnila všechny zdroje, ze kterých jsem čerpala a které jsou online dostupné. Snad je již vše v pořádku. Přeji krásný zbytek víkendu.

S pozdravem



-- Kamila Vlčková 14.5.2017, 13:10

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send

Cancel