

# Epitelové nádory ústní dutiny

Epitelové nádory dutiny ústní rozdělujeme na benigní a maligní.

## Epitelové benigní nádory

### Dlaždicobuněčný papilom

- Vyskytuje se hlavně na patře, bukalní sliznici a rtech.

## Epitelové maligní nádory

### Karcinom rtu

- Výskyt hlavně na dolním rtu.
- Převážně u starších mužů.
- Metastazuje do submandibulárních a submentálních uzlin velmi pozdě.
- Diagnóza velmi dobrá.
- Zpočátku malé zatvrdnutí na rtu, poté odlučování epitelů, tvorba krusty, pod krustou vzniká vřed.



Dlaždicobuněčný karcinom

### Karcinom jazyka

- Nejmalignější nádor dutiny ústní.
- Metastazuje do uzlin i do plic.
- Vzniká na okrajích střední třetiny jazyka, hrotu a v kořeni.
- Roste rychle do hloubky.
- Třikrát častější u mužů.
- Zpočátku jen zatvrdnutí jazyka, později vřed, bolest, roste květákovitě i endofyticky.



Exofytický karcinom jazyka

### Karcinom spodiny dutiny ústní

- Velmi častý.
- Zatvrdlý vřed, obvykle uložen laterálně od střední části spodiny.
- Roste exofyticky i endofyticky.
- Často metastazuje kontralaterálně do regionálních uzlin.

### Karcinom bukalní sliznice

- Ulcerace se zatvrdlou spodinou.
- Hlavně v oblasti molárů.
- Často exofytický růst.

### Karcinom patra

- Častěji se vyskytuje v měkkém patře.
- Jeví se jako ulcerace.

### Karcinom dásně

- Roste exofyticky i endofyticky.
- Často destruuje kost.
- V maxille může prorůst až do čelistní dutiny.

### Verukosní karcinom

## Odkazy

### Použitá literatura

- LIŠKA, Karel. *Orofaciální patologie*. 1. vydání. 1983.