

Fórum:Testy2/Rozšířené otázky s výběrem odpovědi

Rozšířené přiřazovací otázky (*extended-matching questions, EMQ*; podle amerického National Board of Medical Examiners **typ R**) patří k nově zaváděným testovým formátům. Společně s otázkami s jedinou nejlepší odpovědí (SBA) se dnes EMQ doporučují jako jeden z hlavních prostředků pro písemné testy. Původně se používaly pro testování klinických znalostí a dovedností, dnes však nacházejí stále větší uplatnění i v teoretických předmětech.

Kmen rozšířených přiřazovacích otázek bývá poměrně dlouhý – zpravidla jej tvoří **klinický medailonek** nebo **scénář**. Testovaný vybírá jedinou nejlepší odpověď z většího množství nabízených možností. Otázky, které se týkají stejně oblasti, zpravidla využívají jednu společnou sadu možných odpovědí.

- *Okruh: Bolesti břicha - diagnostika*
- **Otázka:** Vyberte nejpravděpodobnější diagnózu pro každý z níže uvedených případů
- **Nabídnuté odpovědi:**

Možnosti:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| A. Aneurysma abdominální aorty | K. Nefrolitiáza |
| B. Appendicitis | L. Mesenteriální lymfadenitida |
| C. Obstrukční ileus | M. Trombóza mezenteriální arterie |
| D. Cholecystitida | N. Ruptura ovariální cysty |
| E. Karcinom tlustého střeva | O. Pankreatitida |
| F. Zácpa | P. Pelvic inflammatory disease |
| G. Divertikulitida | Q. Peptický vřed |
| H. Mimoděložní těhotenství – ruptura | R. Perforovaný peptický vřed |
| I. Endometrióza | S. Pyelonefritida |
| J. Kýla | T. Torze ovaria |

- **Kmen otázky:** 25letá žena přichází pro náhle vzniklou bolest v pravém dolním břišním kvadrantu, která se postupně zhoršuje. Pociťuje nauseu, ale nezvraci. Před začátkem bolesti byla zdráva. Při vyšetření je v pravém dolním kvadrantu hmatná hluboko uložená rezistence, která je palpačně citlivá. Peristaltika je zachována. Per vaginam je vpravo hmatná tuhá rezistence o průměru asi 7 cm. Hematokrit je 32 %, počet leukocytů v periferní krvi je 18 tisíc / mm³. Aktivita amylázy v séru je v referenčních mezích, zkouška na okultní krvácení do stolice je negativní.

Odpověď:

Položka může mít více kmenů otázky (scénářů) ke stejné sadě nabídnutých odpovědí.

💡 Podrobnější informace najeznete na stránce Fórum:Testy2/EMQ.