

Gingivitidy v dětském věku



Článek byl označen za rozpracovaný,

od jeho poslední editace však již uplynulo více než 30 dní

Chcete-li jej upravit, pokuste se nejprve vyhledat autora v historii (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Gingivitidy_v_d%C4%9Btsk%C3%A9m_v%C4%9Bku&action=history) a kontaktovat jej. Podívejte se také do diskuse (https://www.wikiskripta.eu/w/Diskuse:Gingivitidy_v_d%C4%9Btsk%C3%A9m_v%C4%9Bku).

Pokud vše nasvědčuje tomu, že původní autor nebude v editacích v nejbližší době pokračovat, odstraňte šablonu {{Pracuje se}} a stránku .

Stránka byla naposledy aktualizována ve středu 19. prosince 2018 v 17:59.

- Zánět marginální gingivy je nejobvyklejší parodontopatií v dětském věku.
- Dentogingivální připojení nebývá postiženo.
- Nejčastější lokalizace je ve frontálním úseku horní i dolní čelisti.
- Rozhodujícím etiologickým faktorem je kumulace dentálního plaku, který se v zásadě neliší od plaku dospělých.
- Supragingivální zubní plak nacházíme u dětí zpravidla v sousedství velkých slinných žláz.
- Subgingivální plak je řídkým nálezem.

Etiologie

- Gingivitis eruptiva
 - Prořezávání stálých zubů provázeno gingivitidou.
 - Příčinou je kombinace kumulace plaku a traumatizace dásně.
- Orotodontické vady
- Kariézní léze
- Výplně
- Ortodontické aparáty
- Úpony retních uzdiček a mělké dolní vestibulum
- Dýchání ústy
- Jako součást infekcí horních cest dýchacích

Použitá literatura

- FIALOVÁ, Sylvia a Květoslava NOVÁKOVÁ. *Vybrané kapitoly z pedostomatologie*. 2. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 8024408945.