

Halucinace

Halucinace je klinicky závažnou kvalitativní poruchou vnímání, můžeme ji definovat jako **dojem reálného vjemu bez působení příslušného podnětu**. Nemocný je nezvratně přesvědčen o pravdivosti vnímaných jevů a jedná tedy v souladu s nimi. V případě, že pacient halucinaci ignoruje, popř. ví, že to co vnímá, není skutečné, jedná se o pseudohalucinace. Halucinace dělíme na simplexní a komplexní.

Simplexní halucinace jsou převážně na úrovni čití. Např. **akoasmata**, kdy pacient slyší rány, nářek, smích, pláč, atd., **fotomy** - nemocný vidí jiskry, záblesky, apod.

Komplexní halucinace je šalebné vnímání jednoho smyslu (např. sluchu) anebo kombinace několika smyslů.

Halucinace optické

Extrakampinní – nemocný je schopen vidět věci mimo své zorné pole, popř. dosah svého smyslového orgánu (Svoboda, et. al. 2012). Vidí tedy například, co se děje za jeho zády, aniž by se otočil, vidí na extrémní vzdálenosti apod.

Mikroskopie – pacient vnímá předměty a osoby menší, než ve skutečnosti jsou.

Makropsie – opak mikropsie, pacient vše vnímá zvětšené.

Mikrozoopsie – nemocný halucinuje malá zvířata, nejčastěji hmyz, častý výskyt je u deliria tremens.

Autoskopické – nemocný vidí sám sebe, dvojník může být průhledný nebo vybledlý.

Halucinace auditivní

- jsou nejčastějším druhem halucinací, nemocní o nich mluví jako o hlasech.

Halucinace hudby nebo zpěvu

Hlasy

1. **Imperativní** – hlas nemocnému přikazuje
2. **Teleologické** – hlas nemocnému radí, popř. mu nadává
3. **Antagonistické** – pacient slyší více hlasů

Halucinace olfaktorické

- obsahem čichových halucinací jsou nejčastěji pachy nepříjemné, nemocný cítí plyny, hnilibu, tlející maso, apod.

Halucinace gustatorické

- chuťové halucinace bývají spjaty s halucinacemi čichovými, kdy se nemocný domnívá, že jeho potrava je zkažená, otrávená

Halucinace viscerální

- nemocný pocítuje orgánové změny, např. chybějící žaludek, nebo přítomnost věcí, které v těle být nemají, např. ve střevech jsou hadi, v mozku implantát atd.

Halucinace motorické

- pacient buď vnímá pohyby v klidové poloze anebo se skutečně pohybuje, může nabýt dojmu, že umí létat, šplhat po zdech a stropě, někdy si může myslet, že spolu s ním se pohybuje i vybavení místnosti

Verbálně motorické halucinace Séglasovy – někdo mluví nemocného ústy

Graficko-motorické halucinace – někdo užívá pacientovu ruku k písmu

Halucinace posedlosti – nemocný má pocit, že je posednut dáslem, zlými duchy a ti s ním provádí pohyby.

Nezařazené halucinace

Halucinace inadekvátní – pacient je přesvědčen, že vnímá jiným čidlem, např. vidí prstem, slyší kolenem (synestézie)

Kahlbaumovy halucinace – nemocný např. při zavření dveří slyší výhrůžky, nadávky...

Intrapsychické halucinace – typické výhradně pro poruchy schizofrenního okruhu, pacient je přesvědčen, že mu někdo do hlavy vkládá myšlenky nebo mu je naopak krade, je zde přítomna bludná představa

Odkazy

Související články

- Vnímání a jeho poruchy
- Bludy

Použitá literatura

- SVOBODA, Mojmír a Eva ČEŠKOVÁ. *Psychopathologie a psychiatrie : pro psychology a speciální pedagogiy.* 2. vydání. Praha : Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0216-5.