

Monteggiaova zlomenina

- Zlomenina ulny s luxací hlavičky radia (roztržení lig. annulare radii s nestabilitou a dislokací hlavičky radia).

Klasifikace

- dle dislokace **radia** (Badov klasifikace):

I. Hlavička luxuje ventrálně. Nejčastější u dětí.

II. Hlavička luxuje dorsálně. Nejčastější u dospělých.

III. Hlavička luxuje laterálně. Ulna zlomena v proximální metafýze.

IV. Zlomenina ulny i radia v diafýze, hlavička radia luxuje kterýmkoliv směrem.

Klinický obraz a diagnostika

- Úlevová poloha – semiflexe + pronace, klinicky bolest, otok, hematom, omezení hybnosti
- Může být poškozena hluboká větev n. radialis
- Na RTG (AP + LAT) – McLaughlinovo znamení – osa diafýsy radia prochází hlavičkou humeru.

Léčba

Vždy **operační**

- Otevřená reposice a dlahová OSY ulny (autokompresní dlahu)
- Potom revise hlavičky radia (reposici může bránit interponované kloubné pouzdro) a sutura přetrženého lig. annulare radii
- Po operaci sádrová dlahu nebo ortéza na 14 dní, dále postupná rehabilitace (po 3 týdnech rotační pohyby)



RTG snímek
Monteggieovy zlomeniny
pravého předloktí.

Odkazy

Související články

- Zlomeniny předloktí
 - Sdružené zlomeniny radia a ulny
 - Isolované zlomeniny radia a ulny
 - Zlomeniny proximální ulny
 - Smithova zlomenina
 - Galeazziho zlomenina
 - Collesova zlomenina
- Radius
- Ulna

Zdroj

- PASTOR, Jan. *Langenbeck's medical web page* [online]. [cit. 31.03.2010]. <<https://langenbeck.webs.com/>>.