

# Musculus occipitofrontalis

**Musculus occipitofrontalis** je sval pokrývající lebeční klenbu. Skládá se ze dvou částí – z ventrální části, kterou nazýváme m. frontalis; z dorzální části, kterou nazýváme m. occipitalis. Společně s m. temporoparietalis vytváří m. epicranii.

## Musculus frontalis (venter frontalis m. occipitofrontalis)

**Začátek:** podkoží a kůže v oblasti glabelly a obočí; okraje m. procerus, m. orbicularis oculi.

**Úpon:** galea aponeurotica.

**Inervace:** n. facialis.

**Funkce:**

- táhne kůži čela kraniálně;
- napomáhá zdvihání horního víčka (pozornost, údiv);
- podmiňuje vodorovné vrásky na čele.

## Musculus occipitalis (venter occipitalis m. occipitofrontalis)

**Začátek:** os occipitale – linea nuchalis suprema.

**Úpon:** galea aponeurotica.

**Inervace:** n. facialis.

**Funkce:**

- posouvá galeu aponeuroticu dozadu;
- pomáhá tahu venter frontalis za horní víčko + je jeho antagonistou.

## Odkazy

### Použitá literatura

- ČIHÁK, Radomír. *Anatomie 1*. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
- HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK, et al. *Memorix anatomie*. 2. vydání. Praha : Triton, 2013. ISBN 978-80-7387-712-5.

**musculus occipitofrontalis**  
týločelní sval

*musculus occipitofrontalis*

**TA** A04.1.03.003 (<https://i.faa.unifr.ch/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Entity%20TA98%20EN/04.1.03.003%20Entity%20TA98%20EN.htm>)

**Funkce** pohybuje kůží čela a pomáhá zdvihání horního víčka

**Inervace** n. facialis

**Začátek** podkoží a kůže v oblasti glabelly a obočí / linea nuchalis suprema

**Úpon** galea aponeurotica