

Náplň práce porodní asistentky

- Osvěta žen a jejich partnerů v oblasti plánovaného rodičovství
- Stanovení těhotenství a sledování jeho průběhu
- Včasné zařazení a poučení o vyšetření na odhalení rizikového těhotenství
- Příprava rodičů na novou životní roli (doporučení předporodních kurzů, zdravé stravy, hygieny atd.)
- Doprovázení ženy těhotenstvím a porodem
- Sledování plodu v děloze
- Vedení porodů plodu v poloze podélné hlavičkou
- Provedení nástřihu hráze, vyžaduje-li to situace
- Zašití nekomplikovaného porodního poranění
- V případě nouze i vedení porodu plodu v poloze podélné koncem pánevním
- Rozpoznání těhotenských, porodních a poporodních patologií u matek a dětí a včasné povolání lékaře (v případě krajní nouze, za nepřítomnosti lékaře, provedení manuální lýzy placenty a manuální vyšetření dělohy)
- Vyšetření, sledování a pečování o novorozence a o šestinedělku hlavně prvních deset dní po porodu (profylaktická a screeningová vyšetření)
- Resuscitace novorozence
- Vykonávání ordinací lékaře
- Vedení dokumentace o průběhu porodu, ošetření novorozence, průběhu šestinedělí, výsledcích vyšetření, léčbě aj.
- Vystavování různých potvrzení v rámci svých kompetencí, např. potvrzení o těhotenství
- Vykonávání povolání porodní asistentky podle nejnovějších medicínských poznatků a informování se o platných předpisech k výkonu svého povolání
- Při výslovném přání ženy, když chce být prohlédnuta lékařem, splnit její přání
- Udržení v tajnosti všech informací získaných během výkonu povolání, pokud si žena výslovně nepřeje jinak
- Prokazatelné celoživotní vzdělávání v oboru (vzdělávací akce, školy pro porodní asistentky, studium odborné literatury aj.)
- Možnost použití a podání následující medikace i bez lékařské ordinace:
 1. V otevírací fázi porodu lze podat léky, které tiší bolest, zmírňují křeče, ale neznecitlivují. Např. Buscopanové čípky nebo Tramalové čípky
 2. Při nebezpečném krvácení lze podat léky, které staví krvácení, pokud není lékař na blízku. Např. uterotonika Oxytocin a námelový alkaloid Methylergometrin
 3. Při šití epiziotomie lze podat lokální anestetikum. Např. Lidocain.
 4. Za nouzových situací lze samostatně podávat i tokolytika. Např. Partusisten.

Odkazy

Související články

- Vnitřní vyšetření (porodní asistence)
- Zevní vyšetření (porodní asistence)
- Ošetřovatelské diagnózy

Použitá literatura

VIETEN, Markus, et al. Handbuch für die Hebamme: von Hebammen für Hebammen. 1. vydání. Hippokrates, 2000. 272 s. ISBN 978-3777314457.