

# Procvičování: Diabetická ketoacidóza/Vstupní informace

## Anamnéza

V posledním měsíci hodně zhubnul, odhaduje 10 kg. 2 dny před přijetím opakovaně zvracel, stěžoval si na bolesti břicha. U lékaře nebyl.

## Objektivní nález

- Glasgow Coma Scale: 3–5–4.
- TK 90/40, TF 108/min, DF 34/min.
- Hluboké hlasité dechy.
- **Ameningeální**, izokorické reagující zornice, jazyk oschlý plazí středem, na krku a hrudníku norm. nález.
- Břicho vpadlé pod niveau, při palpaci difuzně **bolestivé**, Blumberg neg., Rovsing neg., Plénies pozit., játra ani slezina nehmatná. Per rectum normální nález.
- Končetiny bez otoků a zn. zánětu.
- Zavedený močový katetr odvedl malé množství koncentrované moči.

**1 GSC** se používá pro posouzení stavu vědomí. Co se hodnotí?

- ☐ Otevření očí
- ☐ Pozitivita Blumbergova znamení
- ☐ Nejlepší hlasový projev
- ☐ Nejlepší senzitivní vjem
- ☐ Nejlepší motorická odpověď
- ☐ Dávkování psychiatrických léčiv

**2** Jakých hodnot může **GCS** nabývat?

- ☐ 0–12
- ☐ 3–12
- ☐ 0–15
- ☐ 3–15
- ☐ 0–10
- ☐ 3–10

**3** Čím je způsobena pozitivita **Blumbergova** znamení?

- ☐ peritoneálním drážděním
- ☐ nadbytkem CO<sub>2</sub> v břišní dutině
- ☐ výhřezem ploténky L<sub>4-5</sub>
- ☐ radikulárním drážděním v bederní páteři

**4** Při vyšetřování **Rovsingova** znamení tlačíme v

- ☐ pravém podbřišku
- ☐ levém podbřišku
- ☐ pravém nadbřišku
- ☐ levém nadbřišku

**5** Při vyšetřování **Pléniesova** znamení používáme

- ☐ pohmat
- ☐ poslech
- ☐ poklep
- ☐ pohled

Submit

**← Zpět na stránku Kazuistika diabetické ketoacidózy**

**Pokračovat na Diferenciálně diagnostická  
rozvaha →**