

Procvičování:Karcinom konečníku/vstupní informace

Rodinná anamnéza: bezvýznamná

Osobní anamnéza: nikdy vážně nestonal, léky neužívá, operace 0, kouří 30 let 20 cigaret denně

Alergie: negativní

Nynější onemocnění: nemocný opakovaně krvácel při stolici z konečníku, obtíže přičítal hemoroidům, které opakovaně v minulosti měl. Lékaře nenavštívil. Po 6 měsících trvání obtíží se přidružil tlak v konečníku a bolest, nemocný se vydal za svým praktickým lékařem. Ten poskytl pacientovi zkoušku na okultní krvácení z trávicího traktu. Vzhledem k jeho pozitivitě jej odeslal na vyšetření na spádovou chirurgii. Tam byl pacient poprvé fyzikálně vyšetřen per rectum s nálezem tuhé hrbolaté resistance asi od 4 cm od svěrače.

1 Bylo správné rozhodnutí praktického lékaře vyšetřit nejdříve pacienta testem na okultní krvácení?

- ☐ ne, měl ho rovnou vyšetřit per rectum
- ☐ ano, vyšetření per rectum provádí jen chirurg
- ☐ ano, vyšetření per rectum se běžně neprovádí

2 Hemorhoidy jsou způsobeny:

- ☐ sedavým způsobem života
- ☐ nízkým tlakem
- ☐ při potížích s vyprazdňováním
- ☐ těhotenstvím

Submit

[← Zpět na stránku Kazuistika - úvod](#)

[Pokračovat na Diferenciální diagnostika →](#)