

# Procvičování: Obecná patologická fyziologie/pokračování 21

**1** Z používaných drog má halucinogenní efekt hlavně

- ☐ heroin
- ☐ kokain
- ☐ LSD a psilocybin
- ☐ marihuana

**2** Centrální typ obezity (kumulace abdominálního tuku) bývá doprovázen

- ☐ hyperinzulinémií
- ☐ zvýšeným rizikem vzniku diabetes mellitus 1. typu
- ☐ inzulinorezistencí
- ☐ vysokou hladinou leptinu

**3** Obezita bývá doprovázena

- ☐ snížením hladiny leptinu
- ☐ zvýšením hladiny leptinu
- ☐ inzulinorezistencí se vzestupem hladiny inzulinu
- ☐ zvýšením účinností inzulinu na periférii

**4** Obezita v lidské populaci je nejčastěji způsobena

- ☐ nadprodukcí leptinu
- ☐ nedostatečnou tvorbou leptinu
- ☐ nedostatek receptorů pro leptin
- ☐ žádnou z uvedených odchylek

**5** Sekundární obezitu nacházíme u

- ☐ Cushingova syndromu
- ☐ hypotyreózy
- ☐ nedostatečností nadledvin
- ☐ Connova syndromu

Submit

← Předchozí ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Obecn%C3%A1\\_patologick%C3%A1\\_fyziologie/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_20](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Obecn%C3%A1_patologick%C3%A1_fyziologie/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_20))

Zpět na obsah ([https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_patofyziologie](https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie))

Další → ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Obecn%C3%A1\\_patologick%C3%A1\\_fyziologie/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_22](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Obecn%C3%A1_patologick%C3%A1_fyziologie/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_22))

Našli jste chybu? Napište!