

# Procvičování: Obecná patologická fyziologie/pokračování 6

## 1 V období puberty se

- ☐ snižuje systolický krevní tlak
- ☐ zvyšuje pulsová frekvence
- ☐ mírně zvyšuje srdeční výdej
- ☐ zvětšuje se poměr hmotnosti myokardu vůči tělesné hmotnosti

## 2 Vznik pubertas praecox vera je způsoben

- ☐ zvýšenou produkci androgenů majících původ v nadledvině
- ☐ zvýšenou produkci STH
- ☐ aktivaci hypotalamu a následně celé osy pohlavních hormonů
- ☐ zvýšenou produkci hormonů štítné žlázy

## 3 Pseudopubertas praecox může být způsobena

- ☐ zvýšenou produkci androgenů a estrogenů kůrou nadledvin
- ☐ aktivaci hypotalamu a následně celé osy pohlavních hormonů
- ☐ zvýšenou aktivitou dřeně nadledvin
- ☐ produkci androgenů a estrogenů hormonálně aktivními nádory

## 4 Změny funkce ovaríí v klimakteriu začínají

- ☐ zvýšenou aktivitou žlutého tělíska
- ☐ sníženou aktivitou žlutého tělíska
- ☐ zvýšenou a nerovnoměrnou produkci estrogenů
- ☐ sníženou a nerovnoměrnou produkci estrogenů

## 5 V období menopauzy

- ☐ je produkce gonadotropních hormonů snížena
- ☐ je produkce gonadotropních hormonů zvýšena
- ☐ se nemění poměr androgenů k estrogenům, protože syntéza obou typů hormonů je výrazně snížena
- ☐ je zvýšen poměr androgeny/estrogeny

Submit

← Předchozí ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Obecn%C3%A1\\_patologick%C3%A1\\_fyziologie](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Obecn%C3%A1_patologick%C3%A1_fyziologie)) Zpět na obsah (<https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1>) Další → ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Obecn%C3%A1\\_patologick%C3%A1\\_fyziologie/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_5](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Obecn%C3%A1_patologick%C3%A1_fyziologie/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_5)) 1n%C3%AD\_patofyziologie) /pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\_7)

Našli jste chybu? Napište!