Procvičování:Patofyziologie endokrinního systému/pokračování 22

1 Vitamin C je nezbytný

- ☐ k hydroxylaci prolinů a lyzinů
- ☐ k syntéze osteokalcinu
- ☐ k syntéze karboxyglutamové kyseliny
- ☐ k maturaci kolagenu

2 5-alfa-dihydrotestosteron je nezbytný pro

- ☐ normální spermatogenezi
- ☐ normální vývoj kůry nadledvin
- ☐ rozvoj charakteristického mužského ochlupení
- ☐ rozvoj svaloviny u muže

3 Absolutní deficit některého z enzymů steroidogeneze androgenů vede u jedince s chromozomální výbavou 46XY k

- ☐ poruše pohlavní diferenciace
- ☐ mužskému pseudohermafroditismu
- ☐ pravému hermafroditismu
- ☐ neplodnosti

4 Androgeny působí

- ☐ proteokatabolicky
- ☐ proteoanabolicky
- ☐ neovlivňují metabolické pochody přímo, ale přes inzulinu podobný růstový faktor 1 (IGF-1)
- ☐ jejich efekt na proteinový metabolismus je minimální

5 Anovulační krvácení je podmíněno

- ☐ zvýšenou sekrecí gonadotropních hormonů
- ☐ sníženou produkcí estrogenů v ovariu
- ☐ urychlenou eliminací gonadotropinů močí
- ☐ následkem nedostatku progesteronu ve druhé části cyklu

Submit

← Předchozí (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_endokrinn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_21) Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie) Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_endokrinn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_23)

Našli jste chybu? Napište!