

# Procvičování: Patofyziologie endokrinního systému/pokračování 26

**1** Následující choroba/choroby jsou spojeny s vysokým rizikem vzniku diabetes mellitus typu

- ☐ kongenitální adrenální hyperplázie
- ☐ Klinefelterův syndrom
- ☐ Turnerův syndrom
- ☐ Cushingův syndrom

**2** Nejúčinnějším androgenním pohlavním hormonem z následujících působků je

- ☐ androstendion
- ☐ dehydroepiandrosteron
- ☐ luteinizační hormon
- ☐ dihydrotestosteron

**3** Nízký vzrůst, nízko posazená vlasová linie, kožní řasa na krku a široký hrudník jsou typické pro

- ☐ Klinefelterův syndrom
- ☐ eunuchoidní habitus
- ☐ Turnerův syndrom
- ☐ Marfanův syndrom

**4** Pozitivní sex-chromatin je charakteristickým nálezem u

- ☐ Turnerova syndromu
- ☐ Klinefelterova syndromu
- ☐ Marfanova syndromu
- ☐ mužského pseudohermafroditismu

**5** Pravá předčasná puberta (pubertas praecox) je na rozdíl od nepravé (pseudopubertas praecox) iniciována

- ☐ zvýšením tvorby gonadotropinů v hypofýze nezávislé na regulaci z hypotalamu
- ☐ pulzní sekrecí gonadoliberinu (LHRH) z hypotalamu
- ☐ zvýšenou tvorbou pohlavních hormonů v gonádách nezávislou na hypofyzární regulaci
- ☐ zvýšenou tvorbou kortizolu v nadledvinách

Submit

← Předchozí ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie\\_endokrinn%C3%ADho\\_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_25](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_endokrinn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_25))

Zpět na obsah ([https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_patofyziologie](https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie))

Další → ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie\\_endokrinn%C3%ADho\\_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_27](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_endokrinn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_27))

Našli jste chybu? Napište!