

Procvičování: Patofyziologie kardiovaskulárního systému/pokračování 13

1 Poinfarktový defekt septa komor vede ke vzniku

- ☐ levo-pravého zkratu
- ☐ pravo-levého zkratu
- ☐ cyanózy centrálního typu
- ☐ diastolického selhání

2 Pro transmurální infarkt myokardu platí

- ☐ vzniká při uzavěru koronární tepny
- ☐ vzniká při 50% stenóze koronární tepny
- ☐ chybí patologický kmit Q
- ☐ dochází k přechodné elevaci úseku ST

3 Při fixní stenóze koronárního řečiště jsou klinické známky ischemie přítomny

- ☐ již při 40% stenóze
- ☐ při 70% stenóze, a to i v klidu
- ☐ při 70% stenóze, ale jen při zátěži
- ☐ při 90% stenóze, ale jen při zátěži

4 Při zvýšené potřebě kyslíku v myokardu se jeho dodávka zabezpečuje

- ☐ především zvýšením extrakce kyslíku
- ☐ především zvýšením průtoku krve myokardem
- ☐ zvýšením extrakce i průtoku, které se na zvýšené dodávce podílejí zhruba stejnou měrou
- ☐ vazodilatací v myokardu navozenou převážně místními metabolickými faktory

5 Příčinou akutního infarktu myokardu je z uvedených možností nejčastěji

- ☐ embolie
- ☐ trombóza vznikající na aterosklerotickém plátu
- ☐ vazospasmus
- ☐ aneurysma koronární tepny

Submit

← Předchozí (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_12)

Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie)

Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_14)

Našli jste chybu? Napište!