

# Procvičování: Patofyziologie kardiovaskulárního systému/pokračování 20

## 1 Ventrikulární extrasystola se vyznačuje

- ☐ normálním tvarem komplexu QRS
- ☐ úplnou kompenzační pauzou následující po extrasystole
- ☐ neúplnou kompenzační pauzou následující po extrasystole
- ☐ abnormálním tvarem vlny T

## 2 Wenckenbachovy periody nacházíme u

- ☐ sinoatriální blokády II. stupně
- ☐ atrioventrikulární blokády III. stupně
- ☐ trifascikulární blokády
- ☐ žádné z uvedených poruch

## 3 WPW (Wolf-Parkinson-White) syndrom je

- ☐ atrioventrikulární blok II. stupně
- ☐ syndrom preexcitace
- ☐ vrozené onemocnění
- ☐ rozpoznatelný na EKG

## 4 Délka diastoly komor

- ☐ se při tachykardii prodlužuje
- ☐ je důležitá pro plnění komor krví
- ☐ je při fibrilaci síní stále stejně dlouhá
- ☐ ovlivňuje zásobení myokardu krví

## 5 Diastolický tlak v levé komoře

- ☐ se v podstatě rovná tlaku v levé síni
- ☐ se rovná diastolickému tlaku v aortě
- ☐ obvykle se pohybuje mezi 60-80mm Hg
- ☐ stoupá při srdečním selhání

Submit

← Předchozí ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie\\_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho\\_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_19](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_19))

Zpět na obsah ([https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_patofyziologie](https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie))

Další → ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie\\_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho\\_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_21](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_21))

Našli jste chybu? Napište!