

Procvičování: Patofyziologie kardiovaskulárního systému/pokračování 25

1 Koarktace aorty se projevuje

- ☐ neměřitelným pulsem na horních končetinách
- ☐ vzestupem tlaku v horní polovině těla a poklesem tlaku (nebo normálním tlakem) pod místem zúžení
- ☐ cyanózou centrálního typu
- ☐ hypertrofií levé komory srdeční v důsledku tlakové zátěže

2 Kompenzační snížení periferního odporu s vysokým, rychlým (Corriganovým) pulsem nacházíme u

- ☐ stenózy aortální chlopně
- ☐ insuficience aortální chlopně
- ☐ stenózy mitrální chlopně
- ☐ insuficience mitrální chlopně

3 Mezi cyanotické srdeční vady (s centrálním typem cyanózy) patří

- ☐ perzistující truncus arteriosus
- ☐ poinfarktový defekt mezikomorvého septa
- ☐ Fallotova tetralogie
- ☐ kongenitální transpozice velkých cév s defektem septa

4 Mezi cyanotické srdeční vady (s centrálním typem cyanózy) patří

- ☐ anatomicko levo-pravé zkraty
- ☐ funkční levo-pravé zkraty
- ☐ anatomické pravo-levé zkraty
- ☐ funkční pravo-levé zkraty

5 Mezi komplikace chlopenních vad patří

- ☐ zvýšená krvácivost
- ☐ tromboembolická nemoc
- ☐ bakteriální endokarditida
- ☐ fibrilace síní

Submit

← Předchozí (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_24)

Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie)

Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_26)

Našli jste chybu? Napište!