

Procvičování: Patofyziologie kardiovaskulárního systému/pokračování 36

1 Adams-Stokesův syndrom

- ☐ je kardiální synkopa vznikající při náhlém poklesu minutového srdečního volumu
- ☐ vzniká při přechodné asystolii
- ☐ je syndrom preexcitace
- ☐ je ortostatická synkopa, vznikající ve stoje hromaděním krve v dolních končetinách s poruchou baroreceptorů

2 Diastolická dysfunkce levé komory

- ☐ bývá způsobena hypertenzí a následnou hypertrofií
- ☐ nebývá způsobena ischemickou chorobou srdeční
- ☐ bývá způsobena hypertrofickou kardiomyopatií
- ☐ nesouvisí s poddajností komory

3 Diastolická dysfunkce nastává při

- ☐ fibrilaci komor
- ☐ hemoperikardu
- ☐ fibrózní perikarditidě
- ☐ arteriální hypotenzi

4 Endotelová dysfunkce

- ☐ je porucha funkce endotelu, která je na počátku aterosklerotického procesu
- ☐ je charakterizována zvýšením adhezivních a prokoagulačních vlastností endotelu
- ☐ k jejímu vzniku může přispívat kouření, hypertenze a hyperlipoproteinémie
- ☐ je typická zvýšenou vazodilatací a antitrombotickými vlastnostmi endotelu

5 Generalizovaná vazodilatace arteriol způsobí

- ☐ pokles krevního tlaku jen v systolické komponentě
- ☐ pokles krevního tlaku jen v diastolické komponentě
- ☐ snížení afterloadu
- ☐ pokles krevního tlaku v systolické i diastolické komponentě

Submit

← Předchozí (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_35)

Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie)

Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_37)

Našli jste chybu? Napište!