

Procvičování: Patofyziologie trávicího traktu

1 Při gastroezofageálním refluxu může dojít

- ☐ ke zvýšení deskvamace dlaždicového epitelu jícnu
- ☐ ke zkrácení doby relaxace kardie
- ☐ k rozvoji Barrettova jícnu
- ☐ k rozvoji adenokarcinomu jícnu

2 Achalázie jícnu je charakterizována mimo jiné

- ☐ zvýšeným tonem horního jícnového svěrače (musc. cricopharyngeus)
- ☐ ochabnutím peristaltiky jícnu
- ☐ neschopností relaxace dolního sfinkteru jícnového svěrače
- ☐ zvýšenou sekundární peristaltikou jícnu

3 U achalázie jícnu se vyskytuje vše kromě

- ☐ poruchy relaxace dolního jícnového svěrače
- ☐ poruchy jícnové peristaltiky
- ☐ ztráty myenterických gangliových buněk ve stěně jícnu
- ☐ stenozující svalové hypertrofie dolního jícnového svěrače

4 Z maligních nádorových onemocnění jícnu se nejčastěji setkáváme s

- ☐ rhabdomyosarkomem
- ☐ melanoblastomem
- ☐ karcinomem
- ☐ lymfomem

5 Patologické změny jícnu při gastroesophageálním refluxu jsou způsobeny

- ☐ vzestupem pH v jícnu a nedostatkem proteináz
- ☐ přítomností HCl a aspartátových proteináz v jícnu
- ☐ přítomností jícnových divertikulů
- ☐ zpomalením a prohloubením peristaltické vlny jícnu

Submit

Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_1) Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_1)

Našli jste chybu? Napište!