

Procvičování: Patofyziologie trávicího traktu/pokračování 16

1 Buddův-Chiariho syndrom

- ☐ je zvláštní forma glomerulopatie v rámci jaterního selhání
- ☐ je provázen portální hypertenzí
- ☐ je tradiční označení ascitu při trombóze portální žíly
- ☐ je choroba způsobená bloádou krevního toku játry (obvykle na podkladě trombózy jaterních žil)

2 Ascites nepatří k příznakům

- ☐ pravostranného srdečního selhání
- ☐ Buddova-Chiariho syndromu
- ☐ nefrotického syndromu
- ☐ akutního levostranného srdečního selhání

3 Chronické poškození jater je zpravidla provázeno následujícími změnami v elektroforéze plazmatických bílkovin

- ☐ snížení albuminu i globulinů
- ☐ zvýšení alfa-globulinů
- ☐ zvýšení albuminu a gama-globulinů
- ☐ snížení albuminu a zvýšení gama-globulinů

4 K projevům dekompenzované jaterní cirhózy patří

- ☐ encefalopatie
- ☐ prodloužený protrombinový čas
- ☐ ikterus
- ☐ retence tekutin

5 Prehepatální portální hypertenze

- ☐ vzniká v důsledku jaterní cirhózy
- ☐ vyznačuje se normálním intrasplenickým tlakem
- ☐ vyznačuje se zvýšeným tlakem v jaterních žilách v zaklínění
- ☐ vede ke vzniku kolaterálního řečiště a portokaválních spojek

Submit

← Předchozí (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_15) Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1ln%C3%AD_hypertenze) Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_17)

Našli jste chybu? Napište!