

Procvičování: Patofyziologie trávicího traktu/pokračování 17

1 Mezi etiologické faktory jaterní cirhózy patří

- ☐ hepatitida A
- ☐ hepatitida C
- ☐ Wilsonova choroba
- ☐ deficit alfa-1-antitrypsinu

2 Jaterní buňky tvoří

- ☐ albumin
- ☐ imunoglobulin M
- ☐ plazmatické koagulační faktory II, V, VII, IX, X
- ☐ alfa-1-antitrypsin

3 Mezi rizikové faktory cholesterolové cholelithiázy patří

- ☐ gravidita
- ☐ hypersekrece cholesterolu
- ☐ choroby a resekce ilea
- ☐ hyposekrece žlučových kyselin

4 Mezi etiopatogenetické mechanismy jaterní encefalopatie patří

- ☐ přítomnost zvýšených hladin toxických látek vzniklých činností střevních bakterií (merkaptany, fenol) v cirkulaci
- ☐ zvýšená tvorba steroidních hormonů v játrech
- ☐ porucha metabolismu amoniaku
- ☐ poruchy neurotransmise

5 Ke vzniku ascitu může vést

- ☐ portální hypertenze
- ☐ nedostatečná produkce aldosteronu
- ☐ snížení onkotického tlaku
- ☐ peritoneální karcinomatóza

Submit

← Předchozí (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_16) Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_18) Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_18)

Našli jste chybu? Napište!