

# Procvičování: Patofyziologie trávicího traktu/pokračování 2

## 1 Hyperacidita žaludku

- ☐ je prakticky vždy přítomna u peptického vředu žaludku
- ☐ vzniká při somatostatinomu (nadprodukcí somatostatinu)
- ☐ je častá u peptického vředu duodena
- ☐ může být vyvolána nadprodukcí gastrinu

## 2 Duodenální vřed

- ☐ je relativně často (asi v 5 % případů) maligní
- ☐ nemůže být způsoben nadprodukcí gastrinu
- ☐ je často doprovázen zvýšeným výdejem HCl
- ☐ je často doprovázen achlorhydií

## 3 Gastrinom

- ☐ je provázen hyperaciditou žaludku
- ☐ je označení maligního lymfomu vznikajícího v žaludku
- ☐ může být provázen průjmy
- ☐ je příčinou Zollinger-Ellisonova syndromu

## 4 Zpomalení žaludeční motility může být způsobeno

- ☐ zvýšeným tonem vagu
- ☐ poraněním břicha
- ☐ karcinomem v distální části žaludku
- ☐ stenózou pyloru

## 5 Zvracení je vyvoláno drážděním centra pro zvracení, které je lokalizováno

- ☐ v oblasti fissura calcarina
- ☐ v dorsolaterální části retikulární formace prodloužené míchy
- ☐ ve frontálním laloku
- ☐ v hypotalamu

Submit

← Předchozí ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie\\_tr%C3%A1vic%C3%ADho\\_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_1](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_1))

Zpět na obsah ([https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_patofyziologie](https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie))

Další → ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie\\_tr%C3%A1vic%C3%ADho\\_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_3](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_3))

Našli jste chybu? Napište!