

# Procvičování: Patofyziologie trávicího traktu/pokračování 20

## 1 Mezi možné příčiny akutní pankreatitidy patří

- ☐ cholelithiáza
- ☐ alkoholismus
- ☐ hypersekrece gastrinu
- ☐ hyperglykémie

## 2 Nejčastější příčinou chronické pankreatitidy je

- ☐ cholelithiáza
- ☐ alkoholismus
- ☐ hyperlipidémie
- ☐ chronické užívání léků

## 3 Mezi rizikové faktory karcinomu pankreatu patří

- ☐ diabetes mellitus
- ☐ vysoký energetický příjem potravou
- ☐ kouření
- ☐ hypersekrece inzulinu

## 4 Predisponující faktor chronické pankreatitidy představuje

- ☐ diabetes insipidus
- ☐ diabetes mellitus
- ☐ pravidelná konzumace alkoholu
- ☐ gastroesofageální reflux

## 5 Fosfolipáza A (PLA)

- ☐ je cytotoxicky působící skupina enzymů
- ☐ při zánětu se podílí na tvorbě prostaglandinů mobilizací kyseliny arachidonové z fosfolipidů
- ☐ aktivuje trypsinogen, a tím se podílí na patogenezi pankreatitidy
- ☐ předpokládá se, že působením na plicní surfaktant se podílí na patogenezi respirační insuficience při akutní pankreatitidě

Submit

← Předchozí ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie\\_tr%C3%A1vic%C3%ADho\\_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_19](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_19)) Zpět na obsah ([https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%AD:Patofyziologie\\_tr%C3%A1vic%C3%ADho\\_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_21](https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_21)) Další → ([https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%AD:Patofyziologie\\_tr%C3%A1vic%C3%ADho\\_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_21](https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_21))

Našli jste chybu? Napište!