

Procvičování: Patofyziologie trávicího traktu/pokračování 5

1 Časný postprandiální syndrom je způsoben

- ☐ pomalým vyprázdněním žaludku
- ☐ rychlým přesunem hyperosmolární tráveniny z žaludku do tenkého střeva
- ☐ poklesem plazmatického objemu a vzestupem hematokritu
- ☐ přesunem vody do střevního lumina

2 Časný postprandiální syndrom se klinicky projevuje

- ☐ kardiovaskulárními obtížemi (tachykardie, pocit bušení srdce)
- ☐ kolikovitými bolestmi
- ☐ vazomotorickými příznaky v důsledku uvolnění serotoninu, histaminu a katecholaminů
- ☐ za 10 až 30 minut po příjmu potravy

3 Příčinou pozdního postprandiálního syndromu je

- ☐ rychlý posun glycidů do střeva a jejich rychlá resorbce
- ☐ posthyperglykemická hypoglykémie
- ☐ diabetes mellitus 2. typu
- ☐ porucha sekrece žluči

4 Důsledkem parciální resekce duodena může být

- ☐ porucha kontroly vyprazdňování žaludku
- ☐ porušené řízení střevní motility
- ☐ porucha řízení pankreatické sekrece
- ☐ porucha řízení sekrece žluči

5 Ulcus bulbi duodeni je multifaktoriální onemocnění. Ukázalo se však, že na jeho vzniku se významně podílí

- ☐ chronická infekce Helicobacter pylori
- ☐ zvýšený výdej gastrinu
- ☐ snížení tonu vagu
- ☐ dysplazie duodenálního epitelu způsobená hypersekrecí digestivních enzymů

Submit

← Předchozí (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_4)

Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie)

Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_tr%C3%A1vic%C3%ADho_traktu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_6)

Našli jste chybu? Napište!