

Procvicovani:Kazuistiky PP2/zdroj

```
<textcards>
  <cardset>
    <card>
      <question>
        Jste jako zdravotník na dětském táboře a užíváte si krásného teplého letního dne. Najednou k Vám
        příběhne vedoucí, ať se přijdete podívat na Honzíka, že se mu špatně dýchá. Když přiběhnete, vidíte 7 leté dítě, které je očividně dušné.
        Slyšíte inspirační stridor, dítě s Vámi komunikuje omezeně, v obličeji je oteklé a zarudlé. Co Vás bude zajímat v anamnéze, ať už se
        zeptáte vedoucího nebo dítěte?
      </question>
      <answer>
        Na odebrání anamnézy v první pomoci nám pomůže zkratka SAMPLE (Symptoms, Allergies, Medications,
        Past medical history, Last oral intake, Events). Dozvíte se, že Honzíkovi se začalo špatně dýchat před chvílí a svědí ho ruka. Alergie má
        na prach, pyl a včelí bodnutí. Bere Xyzal (Levocetirizin). S ničím dalším se neléčí, předtím, že se mu udělalo špatně, tak hráli hru s
        názvem vlajková.
      </answer>
    </card>
    <card>
      <question>
        Co Vás v anamnéze nejvíce zaujalo?
      </question>
      <answer>
        Alergie na včely a svědění ruky. Honzík přiznává, že ho asi něco do ruky bodnulo.
      </answer>
    </card>
    <card>
      <question>
        Na co dostanene podezření a jaký je další postup?
      </question>
      <answer>
        <![CDATA[
          V případě závažné alergie se může rozvinout anafylaktická reakce. V takovém případě je nutno
          jednat rychle, je potřeba podat intramuskulárně epipen, který většinou alergici nosí při sobě.
        <br>
        
        <br>
        </answer>
      </card>
      <card>
        <question>
          Co obsahuje EpiPen?
        </question>
        <answer>
          EpiPen obsahuje 0,3 mg adrenalinu a podává se intramuskulárně, nejčastěji do stehna. Alergici
          jsou poučeni o jeho používání.
        </answer>
      </card>
      <card>
        <question>
          Podali jste EpiPen a Honzíkovi se viditelně ulevilo. Jaký bude Váš další postup?
        </question>
        <answer>
          <![CDATA[
            <b>
            Měli byste zavolat RZS </b>, protože účinek adrenalinu je dočasný a stav je potřeba dále zaléčit, protože antigen, na který je Honzík
            alergický stále zůstává v těle a adrenalin sice ulevil akutním příznakům, ale nezabrání dlouhodobějším účinkům. Důležité je zajistit žílu
            periferní kanylou, podávají se krystaloidy v případě zhoršení tlaku, dále se podávají i.v. antihistaminika, jako je např. Dithiaden.
            Podání kortikoidů se hodí pro pozdější fázi. V případě bronchospasmu se inhalačně podáme β2-mimetika (např. Ventolin).
          </b>
          <br>
          </answer>
        </card>
      </cardset>
    </textcards>
```