

# Prurigo

**Pruriga** jsou silně svědivá onemocnění, převážně chronická, u kterých dochází k tvorbě tvrdých papul („seropapuly“), daných edémem koria – tzv. **pruriginózní uzlíky**. Při delším trvání dochází k lichenifikaci kůže.

## Prurigo simplex acuta (Strophulus infantum)

Občasné náhlé výsevy na trupu a končetinách, uzlíky velikosti špendlíkové hlavičky až čočky, na vrchu se tvoří puchýřek, exkoriace → stroupek zaschlé krve. Někdy impetiginizují. Po zhojení dochází drobným de- a hyperpigmentacím. Někdy se objeví jako alergie na potraviny, jindy po kousnutí blechou. *Diferenciálně diagnosticky* je nutno odlišit varicellu (nesvědí) a svrab.



Prurigo nodularis



## Prurigo simplex subacuta (Prurigo temporanea, adultorum)

Podobné, u dospělých, hlavně ženy středního věku, predilekce na extenzorových plochách, Po řadu měsíců i let se objevují drobné séropapuly, úporně svědí, brzo se rozškrábou a vzniká (de)pigmentovaná skvrnka. Příčiny mohou být různé, někdy v těhotenství (*prurigo gestationis*), jindy při GIT poruchách, jaterních nemocech, alergii.

## Prurigo nodularis Hyde

Na končetinách léta trvající tuhé papuly bradavičnatého vzhledu, úporně svědí, příčina neznámá.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Lichen simplex chronicus.*

## Odkazy

### Související články

- Pruritus

### Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2007. [cit. 2010]. <<http://jirben2.chytrak.cz/materialy/dermatovenerologie.doc>>.