

Pseudobartterův syndrom



Pseudobartterův syndrom je soubor klinických příznaků, které imitují **Bartterův syndrom**, ale mají zcela jinou etiologii.

U většiny pacientů je způsoben **abúzem laxativ** (ztráty iontů gastrointestinálním traktem odlišíme od ztrát ledvinami vyšetřením kaliurézy – zde bude nízká) nebo **abúzem diuretik** (prokážeme přítomnost diuretik v moči toxikologickým rozbořem^[1]) a **při opakovaném zvracení** (při vyšetření moči bude hladina chloridů $< 10 \text{ mmol/den}$ ^[2]).

Syndrom se vyskytuje zejména u mladých žen s anorexia nervosa^[3].

Odkazy

Související články

- Bartterův syndrom

Reference

1. KLENER, Pavel. *Vnitřní lékařství*. 3. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1252-6.
2. TESAŘ, Vladimír a Otto SCHÜCK, et al. *Klinická nefrologie*. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-0503-6.
3. HEROLD, Gerd, et al. *Innere Medizin*. 1. vydání. 2016. 1000 s. ISBN 9783981466058.