

Ruptura perinea

K **ruptuře perinea** neboli k natržení hráze může dojít během vaginálního porodu. Ruptury perinea dělíme na čtyři stupně.:

- **1. stupně:** je poraněna pouze kůže na hrázi;
- **2. stupně:** je poraněna kůže na hrázi a svaly hráze;
- **3. stupně:** je poraněna kůže na hrázi, svaly hráze a také při ruptuře **3a.** méně než 50 % zevního análního sfinkteru, při ruptuře **3b.** více než 50 % zevního análního sfinkteru a při ruptuře **3c.** je poraněn nejen zevní ale i vnitřní anální sfinkter;
- **4. stupně:** je poraněno vše jako při ruptuře 3c. a k tomu ještě anální sliznice.

Pokud dojde k ruptuře perinea 3. nebo 4. stupně, je žena ohrožena nedostatečností análního sfinkteru a může docházet k inkontinenci stolice. Také hrozí vznik rektovaginální píštěle.

Odkazy

Související články

- Poranění za porodu
- Porod
- Poloha, postavení a držení plodu
- CTG

Použitá literatura

- HANÁKOVÁ, Anežka. Repetitorium porodní asistence. První vydání. Praha: Grada, 2021. 288 s. ISBN 978-80-271-1242-5.