

Sinus pilonidalis sacrococcygealis

Jedná se o **vlasový chobot**, uložen subkutánně, nejčastěji ve střední čáře sakrokokcygeální oblasti. Prezentuje se **asymptomaticky** nebo **bolestí** a jako secernující sinus či akutní absces. Etiologie je nejasná, nejspíše multifaktoriální (předpokládá se, že odpadlé chlupy se hromadí predispozičně v intergluteální rýze a vpichují se do potních žláz při současné maceraci kůže potem).

Rozdělení

- vrožený - častý u dětí, jeví se dermoidní cysta ve střední oblasti nad sakrální kostí
- získaný - často u dospělých, obézních, bohatě ochlupených mužů

Predispoziční faktory

- hluboká intergluteální rýha
- silné ochlupení
- nedostatečná hygiena
- obezita
- dlouhodobý tlak na danou oblast (tzv. džípová nemoc)

Terapie

Konzervativní

- širokospektrá ATB
- vyholení intergluteální rýhy a okolí
- lokální antiseptické masti a roztoky

Chirurgická

- incize s drenáží u akutních stavů
- excize s primární či odloženou suturou
- excize a marsupializace
- **Lordova metoda** - kyretáž všech píštělí a eventuálně naplnění roztokem fenolu (při rozsáhlém fistulujícím postižení)
- excize a překrytí kožním lalokem v torpidních případech (bez tendence ke zlepšení)

Odkazy

Související články

- Vrožené vývojové vady
- Obezita

Použitá literatura

ZEMAN, Miroslav. *Speciální chirurgie*. - vydání. Galén, 2014. 511 s. ISBN 9788074921285.

Reference