

Syndrom Déjerine-Roussyho



Článek byl označen za rozpracovaný,

od jeho poslední editace však již uplynulo více než 30 dní

Chcete-li jej upravit, pokuste se nejprve vyhledat autora v historii (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Syndrom_D%C3%A9jerine-Roussyho&action=history) a kontaktovat jej. Podívejte se také do diskuse (https://www.wikiskripta.eu/w/Diskuse:Syndrom_D%C3%A9jerine-Roussyho).

Pokud vše nasvědčuje tomu, že původní autor nebude v editacích v nejbližší době pokračovat, odstraňte šablonu {{Pracuje se}} a stránku .

Stránka byla naposledy aktualizována v úterý 7. května 2019 v 11:44.

Je porucha cévního zásobení v teritoriu talamogenikulárních artérií, které odpovídá skupině ventrolaterálních jader. Talamogenikulární aa. tvoří skupinu 6 až 10 drobných tepének, které se oddělují z a. cerebri post. až po odstupu a. communicans post.

Klinický obraz:

Syndrom s kontralaterálním hemipostižením ve smyslu dominující a perzistující senzitivní poruchy ve všech modalitách, ataxie, hyperkinéz, bolesti a dysestézií a rychle regredující lehké hemiparézy.

Použitá literatura:

WABERŽINEK, Gerhard. *Základy obecné neurologie*. Praha: Karolinum, 2004. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0803-0.