

Uživatel:Zef/wd2

Warfarin, je účinná látka patřící do skupin, antikoagulans, rodenticid
Objevitelem je xxxxx.

Indikace

Warfarin se podává v těchto indikacích:

- tromboflebitida
- fibrilace síní

Kontraindikace

Warfarin je kontraindikována při xxxxx.

Dávkování

Dospělí

Denní dávka xxx mg/den, podává se xxxx denně. Dobra trvání léčby je xxxx. Maximální dávka je xxxx. Počáteční dávka je xxxx.

Porucha funkce ledvin

Warfarin je vylučován ledvinami. U pacientů se závažným poškozením funkce ledvin (clearance kreatininu méně než 50 ml/min) se doporučuje snížit dávku na xxxx. Obvyklá cesta podání je ústní podání.

Děti

Doporučená dávka k léčbě xxxx u dětí je /kg/den až /kg/den. Dospívajícím od 12 let se podává dávka jako pro dospělé.


Odkazy

Reference


1. {Citace | typ = web | příjmení1 = WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology | url = https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=A02BA02 | název = WHOCC - ATC/DDD Index | citováno = 2019-04-28}

[[Kategorie:Léčiva]]

warfarin

B01AA03 

ATC kód B01,



chemická struktura warfarin

Definovaná denní dávka

7.5 miligram^[1]

Indikace

,
tromboflebitida,
fibrilace síní

Interakce

, Paracetamol

Chemická struktura

C₁₉H₁₆O₄